

## **Aniridia**

Anirida je kongenitalna, **nasledna**, bilateralna hipoplazija irisa (**dužice**), koja može biti udružena sa drugim očnim defektima. To nije izolovani već poremećaj celog **oka** sa posledičnom hipoplazijom i makule i optičkog nerva, kataraktom, promenama na kornei.

### **Uzrok nastanka**

Aniridia je nasledni poremećaj, nasleđuje se autosomno dominantno.

### **Klinička slika**

Od subjektivnih simptoma je pre svega prisutna niska oštrina vida, koja nije proporcionalna stepenu hipoplazije irisa. Zatim postoji fotofobija (**pojačana osetljivost na svetlost**). Objektivno se zapaža nedostatak irisa, nistagmus (**titranje očnih jabučica**), strabizam (**skretanje oka**), glaukom (**povećan očni pritisak**), gubitak fovealnog refleksa.

### **Dijagnoza**

Postavlja se na osnovu oftalmološkog pregleda.

### **Lečenje**

Lečenje hipoplazije irisa je nemoguće tako da je terapija simptomatska. Treba prevenirati nastanak glaukoma, korigovati refrakterne poremećaje, lečiti strabizam i druge poremećaje koji se javljaju uz hipoplaziju irisa.