

Blefarospazam

Refleksni blefarospazam je tonični grč m. orbicularis oculi (grč kapka) i nastaje nadražajem nerva trigeminusa pri brojnim oboljenjima oka - keratoconjunctivitis, iridocyclitis i dr). Kod ovakvog blefarospazma **kapci** su trajno grčevito **zatvoreni**. Blefarospazam udružen zajedno sa **suzenjem** (epiphora) i **nepodnošenjem svetlosti** (photophobia) predstavlja trijas iritativnih simptoma koji se javljaju kod zapaljenih promena na vežnjači (conjunctivitisa) i oboljenja prednjeg segmenta (keratitis, iridociklitis). Izlečenje nastupa kada se izleći bolest koja je izazvala blefarospazam.

Simptomatski blefarospazam nastaje usled nadražaja centralnih ili perifernih delova facijalnog nerva i refleksnim putem usled nadražaja oftalmičkog i optičkog **nerva**. Pored grčevito zatvorenih kapaka, grčem mogu biti zahavaćeni drugi mišići lica inervisani n. facialisom. Obično se radi o kombinaciji toničkih i kloničnih grčenja. Simptomatski blefarospazam nastaje obično usled intrakranijalnih procesa (postencefalitički parkinsonizam, apsesi, tumori) Pomoć se sastoji u lečenju osnovnog oboljenja. Privremena poboljšanja mogu se postići injekcijama 50%-og alkohola u m. orbicularis oculi.