

Distihijaza

Distihijaza je redak **poremećaj** koji se karakteriše abnormalnim **rastom trepavica** iz otvora Meibomovih žlezda na zadnjoj strani tarzusa **kapaka**.

Uzrok nastanka

Postoje dva tipa distihijaze - kongenitalni (urođeni) i stečeni. Kongenitalna forma se nasleđuje autosomno dominantno. Stečeni oblik nastaje kod Stevens-Johnson-ovog sindroma, hroničnih blefarokonjunktivitisa, trauma, hemijskih opekotina.

Klinička slika

Trepavice mogu biti zadebljale ili veoma tanke, nepigmentovane ili normalno prebojene, pravilno ili pogrešno usmerene što ometa zatvaranje oka. Distihijaza se može javiti na gornjem i/ili donjem kapku. Kada tako izrasle trepavice dođu u kontakt sa korneom, mogu izazvati iritaciju, epiforu (**suzenje oka**), abrazije ili ulceracije korneje. Kongenitalna distihijaza može biti izolovana ili udružena sa ptozom (**spušten kapak**), strabizmom, urođenim srčanim manama ili mandibulofacijalnom dizosotomom.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze i pregleda.

Lečenje

Simptomatska terapija podrazumeva korišćenje masti i po potrebi zatvaranje oka zavojem, da ne bi došlo do daljih oštećenja korneje. Definitivno lečenje podrazumeva uklanjanje abnormalnih trepavica hirurškim putem, krioterapijom, elektrolizom ili laserom.