

## **Halacion**

Halacion je hronično **zapaljenje** Meibomovih **žlezda**. Meibomove žlezde su vertikalno poređane lojne žlezde u tarzalnim pločicama očnih **kapaka**.

### **Uzrok nastanka**

Začepljenje odvodnog kanala Meibomove žlezde dovodi do zastoja sekreta i reaktivnog zapaljenja u žlezdi i njenoj okolini.

### **Klinička slika**

Halacion je obično lokalizovan dalje od ruba, a mnogo ređe na samom rubu kapaka. Klinička slika se odlikuje stvaranjem bezbolnog **čvorića**, u toku nekoliko nedelja ili meseci, koji je veličine bibera, ređe može da naraste do veličine zrna graška, pa i više. Bolesnik oseća **grebanje u oku** i promena mu smeta zbog estetskog izgleda. Čvorić je čvrste konzistencije, smešten je u tarzusu, a koža nad njim je pokretna i bez znakova zapaljenja. Na **konjunktivi** se na mestu halaciona obično nalazi okruglo crvenkastomodro rumenilo. Halacion retko može da se spontano resorbuje. Može da probije kroz vežnjaču, kada se na njoj stvara granulaciono tkivo polipoznog izgleda. Najčešće ostaje mesecima neizmenjen.

### **Dijagnoza**

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i oftalmološkog pregleda.

### **Lečenje**

Lečenje je hirurško. Posle hirurškog uklanjanja mogu da se javi recidivi.