

Inkluzorni konjuktivitis - uzročnik Chlamydia trachomatis

Conjunctivitis inclusoria je deo okulogenitalne **infekcije** izazvane određenim serološkim tipovima Chlamydiae trachomatis. **Konjunktiva novorođenčeta** se inficira prolazom kroz **porođajne kanale**. Odrasli se najčešće zaraze **seksualnim putem**. Uzročnik može da se nađe i u bazenima gde voda nije hlorisana i da izazove oboljenje konjunktive kod **kupača**.

Conjunctivitis inclusoria neonatorum je akutni gnojni konjuktivitis koji počinje kod novorođene dece 5 -12 dana po rođenju. Klinička slika se odlikuje naglim **otokom kapaka i obilnim sluzavo - gnojnim sekretom**. Konjunktiva je crvena, izražena je papilarna hiperplazija na tarzalnoj konjunktivi, što joj daje somotast izgled. Nema folikula jer kod novorođenčadi nije još razvijeno limfoidno tkivo u kojunktivi. Na rožnjači nema promena. Bolest traje nekoliko nedelja i prolazi bez posledica.

Conjunctivitis inclusoria adultorum (bazenski konjunktivitis) je akutni folikularni konjunktivitis. Bolest počinje naglo **osećajem stranog tela u očima** i fotofobijom, i to obilno kod mlađih adolescenata u toku prvi meseci posle kontakta sa novim seksualnim partnerom. Kapci su umereno otečeni i spušteni. Konjunktiva je crvena, postoji konjunktivalna hiperemija. Na prolaznim borama ima dosta folikula, koji su providni, staklasti i međusobno su jednake veličine. Bolest traje nekoliko meseci i prolazi bez posledica i ožiljaka.

Uzrok nastanka

Conjunctivitis inclusoria je deo okulogenitalne infekcije izazvane određenim serološkim tipovima Chlamydiae trachomatis. Konjunktiva novorođenčeta se inficira prolazom kroz porođajne kanale. Odrasli se najčešće zaraze seksualnim putem. Uzročnik može da se nađe i u bazenima gde voda nije hlorisana i da izazove oboljenje konjunktive kod kupača.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda i brisa konjunktive. Dijagnoza se potvrđuje nalazom inkluzija u razmazu epitelnih ćelija konjunktive.

Lečenje

Primenjuju se antibiotici, najčešće tetraciklini, lokalno i sistemske. Treba istovremeno lečiti oba seksualna partnera.